



РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
им. Н.И. ПИРОГОВА



Вторая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
диагностики и лечения фибрилляции предсердий»
16 ноября 2013 года

Как построить сотрудничество кардиолога и больного фибрилляцией предсердий?

Конференция в НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 16 ноября 2013 года

Карташева Е.Д.

8 ноября 2013 года

Проблема взаимодействия врача и пациента



Конференция в НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 16 ноября 2013 года

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ

Актуальность проблемы


...Если бы больные фибрилляцией предсердий придерживались рекомендаций, данных врачом*, то риск сердечно-сосудистых осложнений снизился бы в 2 раза...

Почему пациенты не соблюдают наши рекомендации?


*Антагонисты кальция и бета-блокаторы

Cramer J.A., 1998


Взаимосвязь ФП с психосоматическими расстройствами



Выраженность тревожно-депрессивных расстройств в зависимости от формы ФП



Терапия варфарином на амбулаторном этапе




1. Samia GP, Arch Intern Med. 2000;160:967

Прием варфарина пожилыми пациентами (> 80 лет)

Баллы CHADS₂


Отказ от терапии

(на 100 человек/год)




Hylek E.M., et al. Circulation. 2007;115:2689-2696

Зависимость уровня МНО от степени когнитивных расстройств



Van Deelen BA, van den Bemt PM, et al. Cognitive impairment as determinant for sub-optimal control of oral anticoagulation treatment in elderly patients with atrial fibrillation. Drugs Aging. 2005;22(4):353-60

Приверженность терапии в зависимости от кратности приема лекарств



Проблема коммуникации как причина низкой приверженности лечению

- Пациент неправильно понял врачебные рекомендации
- Не понял врачебный «жаргон»
- Не понял пользы конкретного препарата
- Вопросы пациента были проигнорированы врачом
- Рекомендации не соответствуют образу жизни пациента
- Несогласия пациента с врачебными назначениями
- Мнение других пациентов, информация из других источников

Проблема коммуникации как причина низкой приверженности лечению



Пациент неправильно понял врачебные рекомендации

Проблема коммуникации как причина низкой приверженности лечению



Не понял медицинскую терминологию

Проблема коммуникации как причина низкой приверженности лечению


Возьму-ка я
аспирин. А что?
Тоже кровь
разжижает!

Конференция в НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 16 ноября 2013 года



Не понял пользы конкретного препарата

Проблема коммуникации как причина низкой приверженности лечению



Вопросы пациента были проигнорированы врачом

Проблема коммуникации как причина низкой приверженности лечению




Конференция в НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 16 ноября 2013 года



**Рекомендации не соответствуют
образу жизни пациента**

Проблема коммуникации как причина низкой приверженности лечению



Несогласие пациента с врачебными назначениями

Проблема коммуникации как причина низкой приверженности лечению



Конференция в НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 16 ноября 2013 года

**Информация из других источников,
мнение других пациентов**



Пути решения проблемы

- Внимательное и уважительное отношение
- Объяснение понятным языком
- Соучастие пациента в собственном лечении
- Индивидуальный подход
- Группы взаимопомощи

Пути решения проблемы



* Приверженность лечению на 26% выше при однократном приеме (по сравнению с двукратным)



Конференция в НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 16 ноября 2013 года

